



アレルギー性鼻炎治療剤

クロモグリク酸Na点鼻液

2%「杏林」

クロモグリク酸ナトリウム点鼻液

薬価基準収載

標準品：インタール点鼻液



クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

効能・効果, 用法・用量, 禁忌等を含む使用上の注意の詳細はドラッグインフォメーションをご覧ください。

日医工株式会社

CROMOGLICATE Na Nasal Solution 2% “KYORIN”

クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」

CROMOGLICATE Na Nasal Solution 2% “KYORIN”

クロモグリク酸ナトリウム点鼻液

DRUG INFORMATION
ドラッグインフォメーション

2018年6月作成（第1版）添付文書に基づいて作成

※禁忌等を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意下さい。（詳細は添付文書をご参照ください。）

注 意	開封後1ヵ月経過した場合は、残液を使用しないこと。	日本標準商品分類番号	87449, 871329
貯 法	気密容器、室温保存	承認年月	2018年1月
使用期限	外箱及びラベルに表示（期限内に使用すること。）	承認番号	23000AMX00175000
販売元	日医工株式会社	薬価収載	2018年6月
製造販売元	キョーリンリメディオ株式会社	販売開始	2000年2月

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者			(2)その他の副作用										
組成・性状	品名	クロモグリク酸Na点鼻液2%「杏林」	使用上の注意	<table><tr><td rowspan="2">種類</td><td>副作用発現頻度</td></tr><tr><td>不 明</td></tr><tr><td>過敏症^{注)}</td><td>発疹</td></tr><tr><td>鼻 腔</td><td>鼻内刺激感、鼻出血</td></tr><tr><td>その他</td><td>頭痛</td></tr></table>	種類	副作用発現頻度	不 明	過敏症 ^{注)}	発疹	鼻 腔	鼻内刺激感、鼻出血	その他	頭痛
	種類	副作用発現頻度											
		不 明											
	過敏症 ^{注)}	発疹											
	鼻 腔	鼻内刺激感、鼻出血											
	その他	頭痛											
有効成分	日局クロモグリク酸ナトリウム												
含 量	1mL中 20mg												
剤形・色調	無色～微黄色澄明の水溶性点鼻剤												
pH	5.0～6.0												
添 加 物	エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物												
効能・効果	アレルギー性鼻炎		2. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。〔動物実験（ウサギ、マウス）で母体に毒性があらわれる大量の注射により胎仔毒性（胎仔吸収、体重減少等）の報告がある。〕 3. 適用上の注意 (1)投与方法：本剤は専用の鼻用定量噴霧器を用いて噴霧吸入させること。内服しても効果はみられない。 (2)投与経路：鼻腔内噴霧用にのみ使用すること。										
用法・用量	1日6回（起床時、日中約3時間毎に4回、就寝前）、1回各鼻腔に1噴霧（クロモグリク酸ナトリウムとして2.6mg）ずつ、本剤専用の鼻用定量噴霧器（マイクロフレーター）を用いて噴霧吸入する。症状の緩解が得られれば、その後の経過を観察しながら減量する。												
使用上の注意	1. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。 (1)重大な副作用（頻度不明） アナフィラキシー様症状：アナフィラキシー様症状（呼吸困難、血管浮腫、蕁麻疹等）があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。												
	9.5mL×10本												

販売元  **日医工株式会社**
NICHIIKO 富山市総曲輪一丁目6番21
<http://www.nichiiko.co.jp>

製造販売元 **キョーリンリメディオ株式会社**
富山県南砺市井波885番地

お問い合わせ先 お客様サポートセンター

 (0120) 517-215
FAX (076) 442-8948